

# Instructies voor toediening via sondes

## PEDIPPI 2MG/ML POEDER VOOR ORALE SUSPENSIE OMEPRAZOL

Pedippi kan worden toegediend via een buisje via de neus middels een nasogastrische sonde (NG sonde) of via een buisje door de huid direct naar de maag (percutane endoscopische gastrostomie sonde (PEG sonde)).

Gebruik een geschikt spuitje dat bij de sonde hoort. Het doseerspuitje uit de verpakking is alleen voor orale toediening.

Voordat u dit medicijn toedient, moet u ervoor zorgen dat de ingaande sonde geen verstoppingen heeft.



**Stap 1: Spoel de ingaande sonde met 5ml water**

**Stap 2: Dien de juiste dosis van dit medicijn toe met een geschikt spuitje**

**Stap 3: Spoel de ingaande sonde nogmaals met 5ml water**

Dit medicijn is geschikt voor gebruik met kunststof sondes (NG sondes en PEG sondes) in de maten 6 Fr tot 16 Fr. Voor de kleinste diameter sondes (6 Fr) kan bij heel jonge kinderen een kleiner spoelvolume van 2ml worden gebruikt.

Pedippi is geregistreerd door Xeolas Pharmaceuticals Ltd, RVG 123563. Voor inlichtingen neem contact op met: Curaphar B.V., De Pinckart 54, 5674CC Nuenen, Telefoon: 040-851 22 90, Email: [info@curaphar.com](mailto:info@curaphar.com), [www.pedippi.nl](http://www.pedippi.nl)

CP/2020/09-01

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: [www.Lareb.nl](http://www.Lareb.nl). Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit medicijn.